

Præparat	Gabapentin
Smertemodalitet	Neuropatisk smerter.
Dosering	Startdosering 300 mg – optrapning efter skema (foreligger). Smertebehandling følger princippet ”start low – go slow”. Optrapningsskema udleveres.
Bivirkninger	Meget almindelige Feber, Træthed. Svimmelhed, Søvnighed. Infektioner. Almindelige Influenzalignende symptomer, Kraftsløshed, Nedsat eller øget appetit, Vægtøgning. Abdominalsmerter, Kvalme, Mundtørhed, Tandkødsbetændelse, Dyspnø, Hoste, Hypertension, Perifere ødemer, , Rhinitis, Leukopeni. Artralgi, Myalg. Aggressivitet, Angst, Depression, Gangforstyrrelser, Konfusion, Søvnløshed, Talebesvær, Tremor, Impotens. Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser. Bivirkninger svinder typisk indenfor to til tre uger i de doser vi anvender.
Interaktioner	Morfin kan øge koncentrationen af gabapentin, Antacida, der indeholder magnesium eller aluminium kan nedsætte optagelsen af gabapentin – to timers interval anbefales
Kontraindikationer	Allergi overfor gabapentin eller indholdsstoffer
Særlige forholdsregler	Let øget risiko for selvmordstanker- og adfærd. Dosis skal reduceres ved nyreinsufficiens og hos ældre. Se ”IRF Rød-gul-grøn”.
Effekt indtræder	Den smertelindrende effekt af gabapentin begynder efter 3 dage. Den fulde smertestillende virkning indtræder først efter 2 – 4 ugers behandling og efter optrapning.
Evidens; NNT & NNH	Relativ stærk evidens ved neuropatiske smerter.
Referencer	IRF ”Neuropatiske smerter”; IRF ”Rød-gul-græn”; (begge Teamsite) samt Promedicin.dk, Indlaeggelsessedel.dk, Medicinkombination.dk. Dansk Cardiologisk Selskab: Anti-arytmisk risiko ved anvendelse af psykofarmaka.