

Præparat	Pregabalin
Smertemodalitet	Neuropatiske smerter som ligeværdigt alternativ til TCA, men effekten er mindre end for TCA.
Dosering	Startdosering 25 mg – optrapning efter skema (foreligger). Optrapning til maksimalt 600 mg (2-3 dosering). Smertebehandling følger princippet ”start low – go slow”. Optrapningsskema udleveres.
Bivirkninger	Meget almindelige: Hovedpine, Somnolens, Svimmelhed Almindelige: Træthed, Vægtøgning, Øget appetit. Diarré, Flatulens, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning. Rhinitis, Ødemer. Artralgi, Muskelkramper, ter. Ataksi, Eufori, Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Irritabilitet, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Koordinationsbesvær, Søvnløshed, Talebesvær, Tremor. Erektile dysfunktion, Nedsat libido. Synsforstyrrelser. Bivirkninger svinder typisk indenfor to til tre uger i de doser vi anvender.
Interaktioner	Forstærker effekten af benzodiazepiner og alkohol.
Kontraindikationer	Allergi overfor pregabalin eller indholdsstoffer. Svær hjerteinsufficiens.
Særlige forholdsregler	Let øget risiko for selvmordstanker- og adfærd. Dosis skal reduceres ved nyreinsufficiens. Se ”IRF Rød-gul-grøn” (IRF)
Effekt indtræder	Den smertelindrende effekt af pregabalin begynder efter 2-3 dage. Den fulde smertestillende virkning indtræder først efter 2 – 4 ugers behandling og efter optrapning.
Evidens; NNT & NNH	Stærk
Referencer	IRF ”Neuropatiske smerter”; IRF ”Rød-gul-grøn”; (begge Teamsite) samt Promedicin.dk, Indlaegsessedel.dk, Medicinkombination.dk.